

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 11
Fecha Revisión: 18-06-2026

PRODUCTO:
ALGACHEM®ASCOPHYLLUM



I.	Nombre Comercial	: ALGACHEM®ASCOPHYLLUM
II.	Ingrediente Activo	: Hecho con 100% Ascophyllum Nodosum
III.	Tipo	: BIOESTIMULANTE
IV.	Concentración	: Ácido Algínico 2.79 % p/v Manitol.....1.30 % p/v Fucoidan.... 2.73 % p/v Nitrógeno total.....0.86 % p/v Potasio (K ₂ O) 7.72 % p/v
V.	Densidad	: 1.10 – 1.20 g/ml
VI.	pH	: 8.0 – 10.0
VII.	Formulación	: Concentrado Soluble, SL.
VIII.	Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX.	Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X.	Autorización SENASA	: N/A
XI.	Características	: ALGACHEM®ASCOPHYLLUM es un producto obtenido a partir de un extracto de algas de <i>Ascophyllum nodosum</i> recolectadas de las limpias aguas costeras del Océano Atlántico Norte. ALGACHEM®ASCOPHYLLUM es una fuente natural de nutrientes principales y secundarios, carbohidratos, aminoácidos y otras sustancias naturales que pueden mejorar el vigor de los cultivos, la eficiencia en el uso de nutrientes y el desarrollo de las plantas. ALGACHEM®ASCOPHYLLUM favorece el desarrollo vegetativo vigoroso, una floración y fructificación fuerte y uniforme, incrementando el rendimiento y las características de calidad de las cosechas.
XII.	Compatibilidad	: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso regular, sin embargo, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad en un recipiente pequeño.
XIII.	Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
XIV.	Precauciones	: Manténganse fuera del alcance de los niños. Almacenar bajo sombra, en lugar seguro, fresco y ventilado, fuera de la exposición directa del sol. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 11
Fecha Revisión: 18-06-2026

PRODUCTO:
ALGACHEM®ASCOPHYLLUM



Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

Se aplica en forma foliar diluyendo en suficiente volumen de agua para la cobertura completa y uniforme de la planta.

Cultivos	Dosis (L/ha/Aplic.)	Concentración (L./200L agua)	Momento de aplicación
Uva de mesa	3.0 -4.0		Aplicar durante el crecimiento vegetativo y floración.
Arándano Fresa.	3.0 -4.0	0.5 – 1.0	Aplicar durante el brotamiento y floración.
Granada		0.5 - 1.0	Aplicar durante el brotamiento y floración.
Palto	3.0 – 5.0		Aplicar desde el inicio de la formación de la panícula hasta el cuajado.
Mango		0.5 – 1.0	Aplicar desde el inicio de la formación de la panícula hasta el cuajado
Banano		0.5 – 1.0	Aplicar desde la aparición de la inflorescencia, cada 15 días.
Naranja, mandarina, limón, tangelo	3.0 -5.0		Aplicar desde el inicio del brotamiento. Realizar 3 aplicaciones.
Esparrago		0.5 – 1.0	Aplicar a la apertura de los filocladios, en el primer y segundo brotamiento. Realizar 3 aplicaciones.
Ajo, cebolla. Brócoli, col, coliflor.		0.5 – 1.0	Aplicar en forma foliar a los 10 a 14 días después del trasplante o siembra.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 11
Fecha Revisión: 18-06-2026

PRODUCTO:
ALGACHEM®ASCOPHYLLUM



Alcachofa. Ají, pimiento, piquillo, paprika, Tomate. Melón, sandía, pepinillo.			Realizar 3 a 4 aplicaciones adicionales cada 15 días durante la etapa de crecimiento vegetativo.
Café Maracuyá Piña		0.5 – 1.0	Aplicar al inicio de la floración y realizar de 3 a 4 aplicaciones.
Caña de azúcar	2.0 – 3.0		Aplicar en forma foliar en el crecimiento vegetativo y realizar de 2 a 3 aplicaciones adicionales.

ALGACHEM®ASCOPHYLLUM puede aplicarse al suelo, preparando una solución e inyectando a través del sistema de riego tecnificado o aplicando a pie de planta (en drench) tanto en frutales como hortalizas. La dosis regular en etapa críticas en hortalizas y frutales es de 3 a 5 L/ha por aplicación.

Ficha técnica válida para Perú.