

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 17
Fecha Revisión: 19-02-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Ca



I. Nombre Comercial	: Fertichem® Ca
II. Ingrediente Activo	: Calcio, nitrógeno, microelementos.
III. Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV. Concentración	: Calcio (Cao) 22,50 % p/v Nitrógeno 10,50 % p/v Magnesio (MgO) 3,00% p/v Boro (B) 0,06 % p/v Cobre 0,15 % p/v Manganeso 0,15 % p/v Molibdeno (Mo)..... 0,0015 % p/v Hierro (Fe) 0,0750 % p/v Zinc (Zn) 0,03 % p/v
V. Densidad	: 1,4 – 1,6 g/ml
VI. pH	: 1,0 – 3,0
VII. Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria ®S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: FertiChem ® Ca es un fertilizante foliar formulado como suspensión que tiene un alto contenido de calcio (proveniente de nitrato de calcio) que promueve la mejor absorción de calcio), además presenta magnesio, macro y micronutrientes, para un crecimiento balanceado de la fruta previniendo además las deficiencias de calcio, dando consistencia y firmeza a hojas, tallos, flores y especialmente a frutos otorgándoles así un mayor peso y mejor conservación. Fertichem ® Ca está complejoado con Gluconato de sodio FertiChem ® Ca evita los desórdenes filológicos causados por deficiencias de Calcio, gracias a su rápida asimilación y transporte por la planta, además de estar enriquecido con Mg, B, Cu, Mn, Mo, Fe y Zinc que complementan la actividad del calcio en las actividades metabólicas de la planta.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 17
Fecha Revisión: 19-02-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Ca



- XII. Compatibilidad** : Se puede mezclar con gran parte de los productos fitosanitarios de uso frecuente, no obstante, en caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad.
- XIII. Fitotoxicidad** : No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
- XIV. Precauciones** : Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas. Mantener fuera del alcance de personas no autorizadas.
Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

XV. Instrucciones de uso:

CULTIVO	DOSIS (ml/200 L)	Dosis (L./ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa.	400 - 600	2 - 3	Aplicar antes de la floración, al final del cuajado, al inicio de la pinta y 7 días después de esta último.
Mango	500 - 600	3 - 4	Aplicar al cuajado del fruto y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Arándanos. Fresa	500 - 600	2 - 3	Aplicar a la floración y al cuajado de los frutos.
Banano	400 - 600	2 - 3	Inicio de formación de vela, inicio de floración, 15 días después de la última.
Limón, naranja, mandarina, tangelo, clementina.	200 - 300	2 - 3	Aplicar al cuajado y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Palto	200 - 300	2 - 3	Aplicar al cuajado y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Pitahaya	700 - 800	4 - 5	Aplicar al inicio de la floración y repetir 3 a 4 aplicaciones después del cuajado cada 15 días.
Olivo	700 - 800	4 - 5	Antes de la floración, en cuajado y al inicio de cambio de color y/o maduración.
Ají, paprika, pimiento, piquillo.	500 - 600	2 - 3	Aplicar desde el cuajado de los frutos y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Tomate			
Alcachofa	500	2-3	Iniciar las aplicaciones previo a la aplicación del ácido giberélico.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 17
Fecha Revisión: 19-02-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Ca



Papa.	300 - 500	2 - 3	Aplicar desde el inicio de la tuberización y repetir las aplicaciones cada 15 días.
Cebolla, ajo.	300 - 500	2 - 3	Aplicar a partir de los 20 días y repetir las aplicaciones cada 15 días.

Ficha técnica válida para Perú.