

FICHA TÉCNICA

Página 1 de 3
Revisión: 16
Fecha Revisión: 20-01-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Zn



I. Nombre Comercial	: FERTICHEM® Zn
II. Ingrediente Activo	: Zinc, nitrógeno.
III. Tipo	: FERTILIZANTES FOLIARES CONVENCIONALES Y ORGÁNICOS
IV. Concentración	: Zinc 11,50 % p/v Nitrógeno 3,00 % p/v
V. Densidad	: 1,2 – 1,5 g/ml
VI. pH	: 1,0 – 3,0
VII. Formulación	: Concentrado Soluble, SL
VIII. Modo de Acción	: Absorción foliar y radicular
IX. Proveedor	: Chemie Agroveterinaria® S.A.C.
X. Autorización SENASA	: N/A
XI. Características	: Corrector de deficiencia de zinc. que actúan como un transportador altamente eficaz permitiendo un mejor aprovechamiento del zinc por la planta. Además, FERTICHEM® Zn está complejado con gluconato de sodio, y enriquecido con aminoácidos Favorece la producción de auxinas; el crecimiento de entrenudos incrementa, el tamaño del follaje y del fruto, es importante en la transformación y transporte de los fosfatos. FERTICHEM® Zn interviene en la síntesis de proteínas, el metabolismo de los carbohidratos y el movimiento del calcio.
XII. Compatibilidad	: No mezclar con productos de extremada reacción ácida o alcalina. Es compatible con los productos para la protección vegetal sin embargo se recomienda realizar pruebas a nivel de campo.
XIII. Fitotoxicidad	: No presenta si se aplica según recomendación de la etiqueta.
XIV. Precauciones	: Agitar bien el producto antes de usar. Almacenar el producto en lugar seguro, fresco y seco en su envase original debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas y personas inexpertas. T° de almacenamiento recomendada: 5 – 40 °C.

FICHA TÉCNICA

Página 2 de 3
Revisión: 16
Fecha Revisión: 20-01-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Zn



XV. Instrucciones de uso:

Aplicación por fertirrigación:

Frutales (Cítricos y Vides): 2 - 3 L/ha (2 - 3 aplicaciones)

Hortalizas: 2 - 3 L/ha (2 aplicaciones)

Aplicaciones Foliares:

CULTIVO	DOSIS (L./ha)	RECOMENDACIONES
Uva de mesa	3,0 – 4,0	A inicio de la brotación y repetir 3 a 4 veces cada 7 a 15 días.
Palto	3,0 – 4,0	Aplicar al inicio de la floración y en el crecimiento del fruto.
Naranja, mandarina, tangelo, clementina, limón.	3,0 – 4,0	Aplicar al cuajado del fruto y durante el desarrollo de estos.
Mango	3,0 – 4,0	Aplicar al inicio de la floración y en el crecimiento del fruto.
Alcachofa	3,0 – 4,0	Aplicar a los 25 días después del trasplante y repetir la aplicación hasta la aparición del escapo floral.
Arándano	3,0 – 4,0	Aplicar al inicio del brotamiento. 3 – 4 aplicaciones cada 15 días.
Banano	2,0 – 3,0	Aplicar desde el inicio del crecimiento del hijuelo repitiendo 3 a 4 veces hasta el inicio de fructificación.
Fresa	2,0 – 3,0	Empezar las aplicaciones a los 30 días después del trasplante. Cada 15 días.
Espárrago	3,0 – 4,0	Al inicio de cada brote y con los plaguicidas de uso corriente.
Ají, pimiento, paprika, piquillo. Tomate.	3,0 – 4,0	15 días después del trasplante y al inicio de cada floración, repetir en el crecimiento del fruto.

CULTIVO	DOSIS (L/200 L)	RECOMENDACIONES
Hortalizas: Espinaca, lechuga, col, brócoli, coliflor, zanahoria, apio Cucurbitáceas: Melón, sandía, pepino.	0,5 – 1,0	Aplicar a los 20 días después de la siembra o trasplante.

FICHA TÉCNICA

Página **3** de **3**
Revisión: 16
Fecha Revisión: 20-01-2026

PRODUCTO:
FERTICHEM® Zn



Leguminosas	0,5 – 1,0	Aplicar desde los 25 días después de la emergencia de las plantas y repetir en floración.
Arroz	0,5 – 1,0	A inicio del macollamiento.
Quinoa	0,5 -1,0	15 días después de la emergencia y al inicio de floración, repetir en el crecimiento del grano.

Ficha técnica válida para Perú.